


# بارداری ایمنی

سیست و دوپیت حقوق از مجموعه کتابهای جامع رسانای تخصصی (پزشکی)

ویرایش دومین هایش بار بارداری ایمنی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی




دفتر سلامت مادران  
وزارت بهداشت درمان  
و آموزش پزشکی

## The 2nd Seminar of Safe Pregnancy




**TwinRh<sup>®</sup> SDF** 300 mcg vial (N, Lm)

CANGENE



- تنها آنتی Rh تأیید شده توسط FDA تحت پوشش بیمه های درمانی در ایران
- درمان اختلال آنتی ارهانش HDN
- اولین و تنها محصول آنتی-دی ایمونوگلوبولین در دنیا برای درمان ITP
- قابل تزریق وریدی و عضلانی به دلیل درجه خلوص بالا
- عاری از نگهدارنده های حیوانی
- حاوی مقادیر پائین A و A

## APO-PENTOXIFYLLINE SR 400 mg Tab.




- دارای تأییدیه FDA
- درمان اختلالات عروقی محیطی
- درمان ایسکمی عروق محیطی مغز
- درمان اختلالات عروق محیطی و جریان خون
- درمان علائم انگلی متناوب ناشی از PAD
- درمان زخم های وریدی ساق پا و زخم های دیابتی



APOTEX INC.

## APO-METFORMIN 500 mg Tab.



- دارای تأییدیه FDA
- دارای اثر القا کننده تخمک گذاری در خانمهای مبتلا به PCO (polycystic ovary)
- داروی بسیار موثر در درمان دیابت غیر وابسته به انسولین
- دارای اثر کاهش لیپوپروتئین خون
- موثر در کاهش میزان تری گلیسرید پلاسما و میزان کل کسترول

گروه داروهای ترکیبی جدید  
طرح تولید کننده داروهای APOTEX INC.



## بارداری ایمن

میزان بروز ویار حاملگی و عوامل دموگرافیک و روانی -  
اجتماعی مرتبط با آن در زنان باردار تحت پوشش مراکز  
بهداشتی درمانی شهرستان نمین ، ۱۳۸۴-۱۳۸۱

دکتر افشان شرقی

**مقدمه :** عوامل موثر بر ایجاد ویار حاملگی هنوز به خوبی شناخته نشده اند هر چند که یک سوم تا نیمی از مادران در دوران بارداری خود آن را تجربه می کنند . هدف مطالعه حاضر تعیین میزان بروز ویار حاملگی و عوامل روانی - اجتماعی و دموگرافیک مرتبط با آن در زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان نمین می باشد .

**روش کار :** این مطالعه از نوع کهورت تاریخی است که در آن به طور تصادفی پرونده خانوار ۱۲۲ مادر تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان نمین که حاملگی خود را با موفقیت به پایان رسانده بودند مورد بررسی قرار گرفت همزمان با مادران مصاحبه حضوری نیز انجام شد. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای روانی - اجتماعی و دموگرافیک با ویار حاملگی از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شد.

**یافته ها :** نتایج مطالعه نشان داد که ۲۷٪ مادران در دوران بارداری ویار حاملگی را تجربه کرده اند. از بین عوامل مختلف جنسیت مذکر جنین و اعتیاد پدران ارتباط مستقیم و قدرت تصمیم گیری مادر در خانواده و مواجهه passive با دود سیگار ارتباط منفی با بروز ویار حاملگی داشت . بین سن مادر، رتبه تولد، وضعیت اشتغال و تحصیلات مادر، وضعیت اقتصادی خانواده با ویار حاملگی رابطه معنی دار یافت نشد.

**نتیجه گیری :** یافتن عوامل خطر ویار حاملگی خصوصا عوامل روانی - اجتماعی می تواند برای شناسایی گروههای در معرض خطر و بکار بستن مداخله های پیشگیرانه برای این گروه مفید باشد .

**کلید واژه ها :** ویار حاملگی ، روانی - اجتماعی ، دموگرافیک